



Viktigt att veta
*om ditt
läkemedel*

Till dig som fått Vazkepa (ikosapentetyl) förskrivet av din läkare

Vazkepa[®]
(ikosapentetyl)

Din läkare har förskrivit läkemedlet Vazkepa till dig för att minska risken för nya hjärtkärlhändelser.

Här kan du läsa mer om hur du använder Vazkepa och vad
du måste tänka på före och under behandlingen.

Informationen i denna broschyr ersätter inte bipacksedeln eller de råd
du får av din läkare. Läs bipacksedeln innan du börjar använda Vazkepa
så att du vet i vilka situationer du ska kontakta din läkare. Har du frågor eller
känner dig osäker på något, kontakta din läkare.


Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------|----|
| Hur kan Vazkepa hjälpa mig? | 4 |
| Hur fungerar Vazkepa? | 6 |
| Så här tar du Vazkepa | 7 |
| Eventuella biverkningar | 8 |
| Innan du börjar använda Vazkepa | 9 |
| Vad mer kan du själv göra? | 10 |
| Vanliga frågor | 11 |




Hur kan Vazkepa
hjälpa mig?

Ateroskleros, också kallat åderförkalkning innebär att fett under lång tid samlas på insidan av blodkärlen och gör det svårare för blodet att passera. Det kan leda till blodproppar som kan orsaka hjärtkärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke.



Normalt blodkärl



Blodkärl drabbat av ateroskleros

Trots standardbehandling med blodfett-sänkande läkemedel som t.ex. statiner har många patienter en fortsatt hög risk. Genom tilläggsbehandling med Vazkepa kan risken för hjärtkärlsjukdomar minska ytterligare.

Vad är Vazkepa?



Vazkepa är ett läkemedel som består av en specifik form av omega-3-fettsyran eikosapentaensyra, vilket utvinns ur fiskolja.

Hur fungerar Vazkepa?

Verkningsmekanismen för Vazkepa är inte helt kartlagd. Mekanismerna är troligen ett flertal och inkluderar bland annat blodfettssänkning, antiinflammatoriska- och antioxidanteffekter. Detta påverkar utveckling, minskar tillväxt och ökar stabiliseringen av ateroskleros (åderförkalkning) och den risk som det kan skapa och därmed minskar Vazkepa risken för hjärtkärlsjukdomar.



Så här tar du Vazkepa



2 kapslar morgon och kväll i samband med måltid eller strax efter.

- Kapslarna ska sväljas hela och **INTE** öppnas, krossas, lösas upp eller tuggas.
- Om du glömmer att ta en dos, ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Om du glömmer att ta läkemedlet under en hel dag, ta bara nästa planerade dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
- Vazkepa ska förvaras vid högst 30 °C.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vazkepa orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna man kan uppleva av Vazkepa:

- blödning (frekventa blåmärken eller svårt att stoppa en blödning)
- förmaksflimmer (hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag)
- svullnad i händer, armar, ben och fötter
- förstoppning
- smärta i muskler, ben eller leder
- gikt
- utslag

Läs bipacksedeln för mer information. Om du upplever biverkningar kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Innan du börjar använda Vazkepa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller kosttillskott.

Tala med din läkare innan du börjar med Vazkepa om:

- du är allergisk mot fisk och/eller skaldjur
- du är allergisk mot soja eller jordnötter
- du har problem med levern
- du har problem med oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer eller förmaksfladder)
- du tar ett antikoagulerande läkemedel (som förhindrar att blodet koagulerar), läkemedel som hämmar trombocyterna (blodplättar) i blodet eller har ökad blödningsrisk

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.



Vad mer kan du själv göra?

Läkemedel i kombination med levnads-
vanor är båda viktiga delar av behandlingen.
Din läkare eller sjuksköterska kommer tala
med dig om livsstilsförändringar som du
själv kan göra utöver att ta din medicin.

Vanliga frågor

Kan jag ta Vazkepa tillsammans med mina andra läkemedel?

SVAR: Vazkepa kan ge ökad blödningsrisk, om du tar andra läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga, t.ex. ett blodförtunnande läkemedel, får du lämna blodprover under behandlingen. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Hur länge ska jag ta Vazkepa?

SVAR: Följ läkarens ordination och ändra inte din dos utan att först tala med din läkare.

Vad gör jag om jag upplever biverkningar?

SVAR: Om du får biverkningar tala alltid med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Han/hon kommer ge dig besked om vad du ska göra men sluta **inte** ta din medicin innan dess.



Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan även rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se